

# RHIZUM



## Коренов биостимулатор



## БИО ВКОРЕНИТЕЛ С ЕКСТРАКТ ОТ РАСТЕНИЯ И АМИНОКИСЕЛИНИ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Аминокиселини                                   | 7,5% w/w (9% w/V) |
| Общ азот (N)                                    | 5% w/w (6% w/V)   |
| Калциев оксид (CaO) водоразтворим               | 2% w/w (2,4% w/V) |
| Калиев оксид (K <sub>2</sub> O) вода-Разтворима | 4% w/w (4,8% w/V) |
| плътност  | 1, 2 g/cc         |
| pH  | 3,5               |

### ОПИСАНИЕ

RHIZUM е течен продукт, изработен от растителни екстракти. Той съдържа също екстракти от водорасли, хуми киселини, фулвик киселини, полизахариди и органични вещества, които активират отново кореновата система.

Целта е началния стадии на вкореняване и вегетативното израстване на растението чрез бързо синтеза на протеини. Следователно се използват преди производството на плодове. Спомага за развитието на кореновата система и абсорбирането на хранителните вещества. Действа благоприятно при стресови ситуации, нападение на нематоди и гъбни патогени.

| Група*         | Почвено л/дка | Начин и време на прилагане   |
|----------------|---------------|--|
| Ароматни       | 0,3-0,5       | Извършете 1-во поливане 10 дни след трансплантацията и 2-ро поливане един месец след това                    |
| Зърнени        | 0,3-0,5       | Извършете 1-во поливане 10 дни след трансплантацията и 2-ро поливане един месец след това                    |
| Цитруси        | 0,4-0,5       | Извършете 1-во поливане 10 дни след трансплантацията и 2-ро поливане един месец след това                    |
| Горски плодове | 0,4-0,5       | Извършете 1-во поливане 10 дни след трансплантацията и 2-ро поливане един месец след това                    |
| Овощки         | 0,4-0,5       | Извършете 1-во поливане 10 дни след трансплантацията и 2-ро поливане един месец след това                    |
| Зеленчуци      | 0,3-0,5       | Извършете 1-во поливане 10 дни след трансплантацията и 2-ро поливане един месец след това                    |
| Индустриални   | 0,3           | Извършете 2 поливания: 1-во: когато културата има от 2 до 4 видими листа. 2-ро: 20 дни след първото поливане |
| Декоративни    | 0,3-0,5       | Извършете 3-4 поливания по време на цикъла на реколтата  |
| Тропически     | 0,5           | Нанесете през сезона на крайното отглеждане на зимата и пролетта   |

\* За други култури извън списъка, моля, попитайте нашия технически отдел.

### ПРЕПОРЪЧАНО ОТ АГРОПРОГРАМА

**Първо приложение:** три пет дни след разсаждане/засаждане 300-500ml/дка

**Второ приложение:** 15 дни след първото приложение

Може да се използва в разсадна фаза на растението 3-4ml/L вода комбинация с подхранващи торове

Смесим е с NEMAQUILL и XILOTROM за борба срещу нематоди и почвени патогени  
**НЯМА КАРАНТИНЕН СРОК**

### СМЕСИ & СЪВМЕСТИМОСТИ

Преди приготвянето на крайната смес трябва да се направи тест за съвместимост. В случай на съмнение, попитайте техническия отдел. НЕ е съвместим с медни масла или минерални масла, сяра, сулфокалцини продукти. За маслиново дърво, може да се смесва със сяра или купрамни продукти.

### ОТГОВОРНОСТИ

Компанията гарантира състава, формулировка и съдържание, обаче, не носи отговорност за злоупотреба с продукта, формулиран изключително за земеделска употреба, и се прилага само за културите и за препоръчителната доза, включена в раздел „ДОЗИ“, с пропорции, посочени в раздел „Описание“. Потребителят носи отговорност за причинени щети (дефект на ефикасността, токсичност, остатъчни вещества и т. н.) чрез пълно или частично неспазване на етикета